



	Viljelyjakso viikoissa	Valon määrä tunneissa	Aqua Vega ml A/ 10 litraa ml B/ 10 litraa	Aqua Flores ml A/ 10 litraa ml B/ 10 litraa	RHIZOTONIC ml/ 10 litraa	CANNAZYM ml/ 10 litraa	CANNABOOST ml/ 10 litraa	PK 13/14 ml/ 10 litraa	EC + mS/cm mukai- sesi	EC Total mS/cm mukai- sesi
KASVU	KASVULLINEN VAIHE									
	Alku / juurtuminen - (3 - 5 päivää) Kastele substraatti									
	<1	18	15-25	-	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
KUKINTA	Kasvullinen vaihe I - Kasvien tilavuus kasvaa									
	0-3 ¹	18	20-30	-	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
	Kasvullinen vaihe II - Kasvun pysähtymiseen asti hedelmöimisen tai kukkien muodostumisen alkamisen jälkeen									
	2-4 ²	12	25-35	-	20	25	20 ⁵	-	1.2-1.6	1.6-2.0
	SUVULLINEN VAIHE									
	Suvullinen vaihe I - Kukat tai hedelmät lisäävät pituutta. Saavutettu korkeuskasvu									
	2-3	12	-	30-40	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
	Suvullinen vaihe II - Kukkien tai hedelmän tilavuus (leveys) kasvaa									
	1	12	-	30-40	5	25	20-40	15	1.6-2.0	2.0-2.4
	Suvullinen vaihe III - Kukkien tai hedelmän massa (paino) kasvaa									
	2-3	12	-	20-30	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
	Suvullinen vaihe IV - Kukkien tai hedelmän kypsytminen									
	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4

- Tämä ajanjakso vaihtelee riippuen lajikkeesta ja kasvien määrästä per m². Emokasvit pysyvät tässä vaiheessa loppuun asti (6-12 kk).
- Siirtyminen 18 tunnista 12 tuntiin vaihtelee riippuen lajikkeesta. Nyrkisääninä on muuttuminen kahden viikon jälkeen.
- Jos kypsyminen tapahtuu liian nopeasti, vähennä valoisaa aikaa. Varo lisäämästä suhteellista kosteutta.
- Jos käytät substraatin uudelleen, lisää CANNAZYM-annostusta määrään 50 ml /10 litraa.
- Standardi on 20 ml /10 litraa. Lisävoimaa kukintaan saat, kun lisäät annostuksen maksimiin 40 ml /10 litraa.

EC: EC+ arvo perustuu suureeseen mS/cm, kun 25 °C:ssa veden EC = 0,0 (pH 6,0).
Säädä käytettävän hanaveden EC suositulle tasolle!
Esimerkin kokonais-EC on 0,4:n EC:n hanaveden EC-arvo.

pH: Suositeltu pH on välillä 5,2 ja 6,2.
pH- voi lisätä EC-arvoa.
Käytä pH- grow -valmistetta kasvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.
Käytä pH- bloom -valmistetta suvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.

Taulukon ohjeet eivät ole mikään viljelyn rautainen laki, mutta ne voivat auttaa uusia, aloittelevia viljelijöitä kehittämään pitkälle viedyn, ammattimaisen lannoitusstrategian. Optimaaliseen lannoitusstrategiaan vaikuttavat vielä seuraavat tekijät: lämpötila, kosteus, kasvilaji, juuriston laajuus, substraatin kosteusprosentti, vedenannostelustrategia jne.

Tee viljelyysi oma ravinteidenantoaikataulusi osoitteessa www.canna.fi.

CANNA
The solution for growth and bloom