



Viljelyjakso
viikoissa

Valon määrä
tunneissa

COCO
ml A/
10 litraa
ml B/
10 litraa

RHIZOTONIC
ml/
10 litraa

CANNAZYM
ml/
10 litraa

CANNABOOST
ml/
10 litraa

PK 13/14
ml/
10 litraa

EC +
mS/cm
mukai-
sesti

EC Total
mS/cm
mukai-
sesti

KASVULLINEN VAIHE

KASVU

Alku / juurtuminen - (3 - 5 päivää)
Kastele substraatti

<1

18

15-25

40

-

-

-

0.7-1.1

1.1-1.5

Kasvullinen vaihe I - Kasvien tilavuus kasvaa

0-3¹

18

20-30

20

25

-

-

0.9-1.3

1.3-1.7

Kasvullinen vaihe II - Kasvun pysähtymiseen asti
hedelmöimisen tai kukkien muodostumisen alkamisen jälkeen

2-4²

12

25-35

20

25

20⁵

-

1.1-1.5

1.5-1.9

SUVULLINEN VAIHE

KUKINTA

Suvullinen vaihe I - Kukat tai hedelmät lisäävät
pituutta. Saavutettu korkeuskasvu

2-3

12

30-40

5

25

20-40

-

1.4-1.8

1.8-2.2

Suvullinen vaihe II - Kukkien tai hedelmän tilavuus
(leveys) kasvaa

1

12

30-40

5

25

20-40

15

1.6-2.0

2.0-2.4

Suvullinen vaihe III - Kukkien tai hedelmän
massa (paino) kasvaa

2-3

12

20-30

5

25

20-40

-

1.0-1.4

1.4-1.8

Suvullinen vaihe IV - Kukkien tai hedelmän
kypsäminen

1-2

10-12³

-

-

25-50⁴

20-40

-

0.0

0.4

- Tämä ajanjakso vaihtelee riippuen lajikkeesta ja kasvien määrästä per m². Emokasvit pysyvät tässä vaiheessa loppuun asti (6-12 kk).
- Siirtyminen 18 tuntiin vaihtelee riippuen lajikkeesta. Nyrkkisääntönä on muuttuminen kahden viikon jälkeen.
- Jos kypsyminen tapahtuu liian nopeasti, vähennä valoisaa aikaa. Varo lisäämästä suhteellista kosteutta.
- Jos käytät substraatin uudelleen, lisää CANNAZYM-annostusta määrään 50 ml /10 litraa.
- Standardi on 20 ml /10 litraa. Lisävoimaa kukintaan saat, kun lisäät annostuksen maksimiin 40 ml /10 litraa.

EC: EC+ arvo perustuu suureeseen mS/cm, kun 25 °C:ssa veden EC = 0,0 (pH 6,0).
Säädä käytettävän hanaveden EC suositulle tasolle!
Esimerkin kokonais-EC on 0,4:n EC:n hanaveden EC-arvo.

pH: Suositeltu pH on välillä 5,5 ja 6,2.
pH- voi lisätä EC-arvoa.
Käytä pH- grow -valmistetta kasvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.
Käytä pH- bloom -valmistetta suvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.

Taulukon ohjeet eivät ole mikään viljelyn rautainen laki, mutta ne voivat auttaa uusia, aloittelevia viljelijöitä kehittämään pitkälle viedyn, ammattimaisen lannoitusstrategian. Optimaaliseen lannoitusstrategiaan vaikuttavat vielä seuraavat tekijät: lämpötila, kosteus, kasvilaji, juuriston laajuus, substraatin kosteusprosentti, vedenannostelustrategia jne.

Tee viljelyysi oma ravinteidenantoaikataulusi osoitteessa www.canna.fi.

CANNA
The solution for growth and bloom