



	Viljelyjakso viikoissa	Valon määrä tunneissa	Hydro Vega ml A/ 10 litraa ml B/ 10 litraa	Hydro Flores ml A/ 10 litraa ml B/ 10 litraa	RHIZOTONIC ml/ 10 litraa	CANNAZYM ml/ 10 litraa	CANNABOOST ml/ 10 litraa	PK 13/14 ml/ 10 litraa	EC + mS/cm mukai- sesti	EC Total mS/cm mukai- sesti
KASVU	<1	18	10-20	-	40	-	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
	0-3 ¹	18	15-25	-	20	25	-	-	0.9-1.3	1.3-1.7
	2-4 ²	12	20-30	-	20	25	20 ⁵	-	1.2-1.6	1.6-2.0
	2-3	12	-	25-35	5	25	20-40	-	1.4-1.8	1.8-2.2
	1	12	-	25-35	5	25	20-40	15	1.5-1.9	1.9-2.3
KUKINTA	2-3	12	-	15-25	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4

- Tämä ajanjakso vaihtelee riippuen lajikkeesta ja kasvien määrästä per m². Emokasvit pysyvät tässä vaiheessa loppuun asti (6–12 kk).
- Siirtyminen 18 tuntiin vaihtelee riippuen lajikkeesta. Nyrkisääntönä on muuttuminen kahden viikon jälkeen.
- Jos kypsyminen tapahtuu liian nopeasti, vähennä valoisaa aikaa. Varo lisäämästä suhteellista kosteutta.
- Jos käytät substraatin uudelleen, lisää CANNAZYM-annostusta määrään 50 ml /10 litraa.
- Standardi on 20 ml /10 litraa. Lisävoimaa kukintaan saat, kun lisäät annostuksen maksimiin 40 ml /10 litraa.

EC: EC+ arvo perustuu suureeseen mS/cm, kun 25 °C:ssa veden EC = 0,0 (pH 6,0).
Säädä käytettävän hanaveden EC suositetulle tasolle!
Esimerkin kokonais-EC on 0,4:n EC:n hanaveden EC-arvo.

pH: Suositeltu pH on välillä 5,2 ja 6,2.
pH- voi lisätä EC-arvoa.
Käytä pH- grow -valmistetta kasvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.
Käytä pH- bloom -valmistetta suvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.

Taulukon ohjeet eivät ole mikään viljelyn rautainen laki, mutta ne voivat auttaa uusia, aloittelevia viljelijöitä kehittämään pitkälle viedyn, ammattimaisen lannoitusstrategian. Optimaaliseen lannoitusstrategiaan vaikuttavat vielä seuraavat tekijät: lämpötila, kosteus, kasvilaji, juuriston laajuus, substraatin kosteusprosentti, vedenannostelustrategia jne.

Tee viljelyysi oma ravinteidenantoaikataulusi osoitteessa www.canna.fi.

CANNA
The solution for growth and bloom