



	Viljelyjakso viikoissa	Valon määrä tunneissa	Terra Vega ml/ 10 litraa	Terra Flores ml/ 10 litraa	RHIZOTONIC ml/ 10 litraa	CANNAZYM ml/ 10 litraa	CANNABOOST ml/ 10 litraa	PK 13/14 ml/ 10 litraa	EC + mS/cm mukal- sesti	EC Total mS/cm mukal- sesti
KASVULLINEN VAIHE										
Alku / juurtuminen - (3 - 5 päivää) Kastele substraatti	<1	18	15-35	-	40	-	-	-	0.4-0.8	0.8-1.2
Kasvullinen vaihe I - Kasvien tilavuus kasvaa	0-3 ¹	18	30-50	-	20	25	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
Kasvullinen vaihe II - Kasvun pysäyttämiseen asti hedelmämisen tai kukkien muodostumisen alkamisen jälkeen	2-4 ²	12	35-55	-	20	25	20 ⁵	-	0.9-1.3	1.3-1.7
SUVULLINEN VAIHE										
Suvullinen vaihe I - Kukat tai hedelmät lisäävät pituutta. Saavutettu korkeuskasvu	2-3	12	-	50-70	5	25	20-40	-	1.2-1.6	1.6-2.0
Suvullinen vaihe II - Kukkien tai hedelmän tilavuus (leveys) kasvaa	1	12	-	50-70	5	25	20-40	15	1.5-1.9	1.9-2.3
Suvullinen vaihe III - Kukkien tai hedelmän massa (paino) kasvaa	2-3	12	-	40-60	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
Suvullinen vaihe IV - Kukkien tai hedelmän kypsyminen	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0.0	0.4

- Tämä ajanjakso vaihtelee riippuen lajikkeesta ja kasvien määrästä per m². Emokasvit pysyvät tässä vaiheessa loppuun asti (6–12 kk).
- Siirtyminen 18 tunnista 12 tuntiin vaihtelee riippuen lajikkeesta. Nyrkkisääntönä on muuttuminen kahden viikon jälkeen.
- Jos kypsyminen tapahtuu liian nopeasti, vähennä valoisaa aikaa. Varo lisäämästä suhteellista kosteutta.
- Jos käytät substraatin uudelleen, lisää CANNAZYM-annostusta määrään 50 ml /10 litraa.
- Standardi on 20 ml /10 litraa. Lisävoimaa kukintaan saat, kun lisäät annostuksen maksimiin 40 ml /10 litraa.

EC: EC+ arvo perustuu suureeseen mS/cm, kun 25 °C:ssa veden EC = 0,0 (pH 6,0).
Säädä käytettävän hanaveden EC suositetulle tasolle!
Esimerkin kokonais-EC on 0,4:n EC:n hanaveden EC-arvo.

pH: Suositeltu pH on välillä 5,8 ja 6,2.
pH- voi lisätä EC-arvoa.
Käytä pH- grow -valmistetta kasvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.
Käytä pH- bloom -valmistetta suvullisessa vaiheessa alentamaan pH-tasoa.

Taulukon ohjeet eivät ole mikään viljelyn rautainen laki, mutta ne voivat auttaa uusia, aloittelevia viljelijöitä kehittämään pitkälle viedyn, ammattimaisen lannoitusstrategian. Optimaaliseen lannoitusstrategiaan vaikuttavat vielä seuraavat tekijät: lämpötila, kosteus, kasvilaji, juuriston laajuus, substraatin kosteusprosentti, vedenannostelustrategia jne.

Tee viljelyysi oma ravinteidenantoaikataulusi osoitteessa www.canna.fi.

CANNA
The solution for growth and bloom