

CANNA HYDRO KOVA VESI

KASVATUSAIKATAULU



ONLINE
KASVATUSOPAS

	KASVUVAIHE				KUKINTAVAIHE						
	JUUR-TUMINEN	I	II		I			II	III	IV	
PÄIVÄT JA VIIKOT	P1-5	P6-25	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
VALOJAKSO	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Annostukset ml/10 l											
CANNA HYDRO VEGA A (kv)	28	31	31	31							
CANNA HYDRO VEGA B (kv)	28	31	31	31							
CANNA HYDRO FLORES A (kv)					32	32	32	32	28	24	
CANNA HYDRO FLORES B (kv)					32	32	32	32	28	24	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
VEDEN EC	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
RAVINTEIDEN EC	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,2 ***	1,7	1,4	
EC YHTEENSÄ	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,9	2,3	2,0	0,6

Tämä viijelyaikataulu on tarkoitettu kasveille, jotka kehittävät kukkia tai hedelmiä, alkaen viikon ikäisestä pistokkaasta tai taimesta. Kukin vaiheen kesto voi vaihdella lajista riippuen.

* Kaksinkertaista CANNAZYM-annostus 50 ml/10 laan jos kasvualusta käytetään uudelleen.

** Lisävoiman tarjoamiseksi nosta CANNABOOSTIN annostusta kukinnan aikana – maksimi 40 ml/10 l.

Pidennettäessä kasvuvaihetta toistetaan kasvuvaiheen I (D6-25) suositeltua annostusta.

Pidennettäessä kukintavaihetta toistetaan generatiivisesta vaiheesta I (W3-W5) suositeltua annostusta.

Lisää CANNA PK 13/14 3–4 viikkoa ennen sadonkorjuuta.

Suosittelava pH-arvo on 5,2–6,2

