

CANNA TERRA

KASVATUSAIKATAULU



ONLINE
KASVATUSOPAS

	KASVUVAIHE				KUKINTAVAIHE						
	JUUR-TUMINEN	I	II		I			II	III	IV	
PÄIVÄT JA VIKOT	P1-5	P6-25	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
VALOJAKSO	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Annostukset ml/10 l											
CANNA TERRA VEGA	41	54	62	62							
CANNA TERRA FLORES					66	66	66	66	66	44	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
VEDEN EC***	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
RAVINTEIDEN EC	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,9 ****	1,5	1,0	
EC YHTEENSÄ	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	1,9	1,4	0,4

Tämä viljelyaikataulu on tarkoitettu kasveille, jotka kehittävät kukkia tai hedelmiä, alkaen viikon ikäisestä pistokkaasta tai taimesta. Kunkin vaiheen kesto voi vaihdella lajista riippuen.

* Kaksinkertaista CANNAZYM-annostus 50 ml/10 laan jos kasvualusta käytetään uudelleen.

** Lisävoiman tarjoamiseksi nosta CANNABOOSTIN annostusta kukinnan aikana – maksimi 40 ml/10 l.

*** CANNA CALMAG AGENT in annostelu riippuu veden EC-arvosta, joka ihanteellisesti on 0,2–0,4 mS/cm. Jos veden EC-lähtöarvo on 0,0 voidaan Calmagia käyttää enimmäisannostuksella, jotta saavutetaan EC-arvo 0,4 mS/cm. Jos lähtöveden EC-arvo on jo yli 0,0 tulisi Calmagia käyttää pienemmällä annostuksella. Tässä esimerkkitaulukossa oletetaan, että veden EC-arvo on (Calmagilla säädetty) 0,4 mS/cm.

Pidennettäessä kasvuvaihetta toistetaan kasvuvaiheen I (D6-25) suositeltua annostusta. Pidennettäessä kukintavaihetta toistetaan generatiivisesta vaiheesta I (W3-W5) suositeltua annostusta.

Lisää CANNA PK 13/14 3–4 viikkoa ennen sadonkorjuuta. Suositeltava pH-arvo on 5,8–6,2

